

VIVENDI® 100

NACHAUFLAUFHERBIZID GEGEN ACKERKRATZDISTEL UND KAMILLEARTEN IN ZUCKER- UND
FUTTERRÜBEN, WINTERRAPS, MAIS, ERDBEEREN UND ZIERGEHÖLZEN
CLOPYRALID 100 g/l [SL]



H E R B I Z I D

**DIE
ANTWORT
AUF DISTELN,
KAMILLE
UND MEHR...**

- Einfache Handhabung dank SL-Formulierung
- Bekämpft zuverlässig Problemunkräuter
- Schnelle Aufnahme und systemische Verteilung
- In Rüben und Raps ACCESS®-Zumischung für noch bessere Wirkung bei Bedarf möglich
- Ausgezeichnete Verträglichkeit in den zugelassenen Kulturen

Beratungshotline 02232-701 25 55

www.upl-ltd.com/de
beratung-de@upl-ltd.com



VIVENDI® 100

VIVENDI® 100 wird schnell über die grünen Pflanzenteile aufgenommen und systemisch in der Unkrautpflanze verteilt. In den ober- und unterirdischen Wachstumszonen greift VIVENDI® 100 in den Eiweißstoffwechsel ein. Die typischen Wirkungssymptome sind: Wachstumsstillstand, Verdrehungen der Blätter und Stängel, Absterben des Vegetationskegels.

Praxistipp:

beste Wirkung gegen Acker-Kratzdistel durch Anwendung bei 15–20 cm Wuchshöhe

WIRKSTOFF	100 g/l Clopyralid
FORMULIERUNG	Wasserlösliches Konzentrat [SL]
WIRKMECHANISMUS	systemisch
HRAC-KLASSE	O
WIRKUNGSSPEKTRUM	Kamille-Arten, Acker-Kratzdistel, Leguminosen, Kornblume, Kreuzkraut, Buchweizen, Franzosenkraut
PACKUNGSGRÖSSEN	4 x 5 l

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

KULTUR	WIRKUNGSSPEKTRUM	AWM	MAX. ANZAHL DER BEHANDLUNGEN	ANWENDUNGSTERMIN	WARTEZEIT (TAGE)
ZUCKERRÜBE, FUTTERRÜBE	Acker-Kratzdistel	1,2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	In der Anwendung 1, in Kultur bzw. je Jahr 2	Nach dem Auflaufen/ bei 15–25 cm Unkrauthöhe/ Teilflächenbehandlung	90
	Acker-Hundskamille, Kamille-Arten			Nach dem Auflaufen/ab 1. Blatt aus Keimscheide; Keimblätter voll entfaltet des Schadorganismus	
WINTERRAPS	Acker-Hundskamille, Kamille-Arten	Bis zum 4- Blattstadium der Kamille: 0,8 l/ha, bis zum Rosettenstadium der Kamille: 1,2 l/ha	In der Anwendung: 1, in der Kultur/je Jahr: 1	Frühjahr, ab Keimblatt der Kamille voll entfaltet	Nicht erforderlich
MAIS	Acker-Kratzdistel	1,2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	In der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1	Nach dem Auflaufen, ab 1. Laubblatt der Kultur aus Keimscheide ausgetreten	Nicht erforderlich
ERDBEERE	Acker-Hundskamille, Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten	1,2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	In der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1	Frühjahr, nach der Blüte	28
				Sommer nach der Ernte	Nicht erforderlich
ZIERGEHÖLZE, BAUMSCHULQUARTIERE	Acker-Hundskamille, Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten	1,2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	In der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1	Frühjahr bis Frühsommer, ab 3. Standjahr der Kultur	Nicht erforderlich



UPL Deutschland GmbH
Kölnstraße 107–109
50321 Brühl
beratung-de@upl-ltd.com
www.upl-ltd.com/de

Alle UPL-Produkte
im Überblick:

